

ФАРМАТАН ГЕЛЬ

Ефективний засіб проти діареї
молодняка сільськогосподарських тварин

farmatan[®]

Фармакодинаміка

Наявність у складі препарату елаготанінів, тимолу, кваркаролу, коричневого альдегіду, евгенолу, гліцерилбутирату забезпечує препарат сильну антимікробну та фунгіцидну дію.

Елаготаніни проявляють гастропротекторну та противиразкову дію. Протизапальна активність препарату реалізується за рахунок вмісту елаготанінів та флавоноїдів, що мають антиоксидантні властивості, які попереджують пероксидацію ліпідів та блокують утворення біореактивних форм кисню.

Пригнічення активності ферментів у циклі арахідонової кислоти призводить до зменшення синтезу медіаторів запалення. Репаративну властивість препарату забезпечують флавоноїди, які стимулюють синтез білка, покращують місцеве кровопостачання.

В'яжуча дія обумовлена утворенням комплексів елаготанінів з білками слизової оболонки. Антитоксична дія реалізується адсорбцією токсинів рослинним вугіллем та утворенням комплексів між ентеротоксинами та елаготанінами. Гліцерилбутират захищає слизову оболонку кишківника, стимулює ріст та розвиток ворсинок слизової оболонки.

Склад Фарматан Геля

Екстракт солодкого каштану (елаготаніни, флаваноїди) – 10%.

Рослинне вугілля – 9%.

Суміш ефірних олій:

ефірна олія орегано (тимол, карвакрол),

ефірна олія кориці (коричний альдегід),

ефірна олія гвоздики (евгенол) – 3%.

Моно, ді та три гліцериди масляної кислоти -78%.

Дозування :

Телята: з 2-денного віку в дозі 8 мл/голову кожні 12 годин (3 рази протягом 36 годин) в разі діареї.

Профілактика: з 2-денного віку у дозі 8 мл/голову. 1 раз на день для поліпшення травлення.

Поросята: з 2-денного віку в дозі 0,5-1,0 мл/голову, протягом 1-3 днів, в разі діареї.